

Требования к вакцинации, для сайта

Взрослые (с 18 лет по 64 года включительно)

| Вакцина                    | Необходимое количество доз для полной вакцинации  | Допустимый временной интервал между вакцинами<br>( В случае меньшего интервала допускается меньшее количество доз) |
|----------------------------|---|--|
| АДС-М (Дифтерия, Столбняк) | Подтвержденные 3 предыдущие дозы АКДС/АДС-М<br>Далее каждые 10 лет.   | 1,5 месяцев  |
| Корь / Краснуха / Паротит  | 2 дозы.<br>Либо наличие антител (анализ действителен в течение 1 года)  | 1 месяц  |
| Гепатит А                  | Требуется, если Вам до 19 лет.<br>2 дозы.   | 6 месяцев  |
| Гепатит В                  | Требуется, если Вам до 60 лет.<br>3 дозы  | 1 месяц между первой и второй,<br>6 месяцев между первой и третьей   |
| Менингококк                | Требуется,если Вам до 19 лет.<br>2 дозы.  | 1 месяц  |
| Ветряная оспа              | 2 дозы.<br>Либо наличие антител (анализ действителен в течение 1 года). Либо наличие истории перенесенного заболевания. | 1 месяц  |
| Грипп                      | 1 доза - ежегодно<br>(Сезонно, с 01 октября по 31 марта)  |  |

Взрослые от 65 лет и выше

| Вакцина                    | Необходимое количество доз для полной вакцинации   | Допустимый временной интервал между вакцинами<br>( В случае меньшего интервала допускается меньшее количество доз) |
|----------------------------|--|--|
| АДС-М (Дифтерия, Столбняк) | Подтвержденные 3 предыдущие дозы (АКДС / АДС-М)<br>Далее каждые 10 лет.  | 1,5 месяцев  |
| Корь / Краснуха / Паротит  | Требуется, если Вы родились в 1957 году и позднее.<br>2 дозы.<br>Либо наличие антител (анализ действителен в течение 1 года) | 1 месяц  |
| Ветряная оспа              | 2 дозы.<br>Либо наличие антител (анализ действителен в течение 1 года).<br>Либо наличие истории перенесенного заболевания.   | 1 месяц  |
| Пневмококк                 | 1 доза.  |  |
| Грипп                      | 1 доза - ежегодно<br>(Сезонно, с 01 октября по 31 марта)   |  |

Дети от 0 до 18 лет

| Вакцина                   | Необходимое количество доз для полной вакцинации   | Допустимый временной интервал между вакцинами<br>( В случае меньшего интервала допускается меньшее количество доз) |
|---------------------------|--|--|
| АКДС                      | Требуется с 3 месяцев до 7 лет.<br>4 дозы.   | 1,5 месяцев  |
| АДС-М                     | Требуется с 7 до 18 лет<br>Подтвержденные 3 предыдущие дозы АКДС<br>Далее каждые 10 лет.               | 1,5 месяцев  |
| Полиомиелит               | Требуется с 2 месяцев до 18 лет<br>3 дозы до 4 лет<br>4 дозы с 4 до 18 лет.                            | 1,5 месяцев  |
| Корь / Краснуха / Паротит | До 6 лет – одна доза.<br>С 6 лет - 2 дозы. Либо наличие антител (анализ действителен в течение 1 года) |  |
| Ротавирус                 | Требуется с 2 до 8 месяцев – 3 дозы  | 2 месяца   |
| Гемофильная инфекция      | Требуется с 2 месяцев до 5 лет<br>4 дозы до 14 месяцев.<br>1 доза с 15 месяцев до 5 лет.               | 1,5 месяцев  |
| Гепатит А                 | С 12 месяцев.<br>2 дозы.   | 6 месяцев  |
| Гепатит В                 | 3 дозы.  | 1 месяц между первой и второй,<br>6 месяцев между первой и третьей   |
| Менингококк               | Требуется с 11 лет.<br>2 дозы  | 1 месяц  |
| Ветряная оспа             | Требуется с 12 месяцев   | 1 месяц  |
| Пневмококк                | С 2 месяцев до 5 лет.<br>4 дозы с 2 месяцев до 23 месяцев.<br>1 доза с 2 до 5 лет.                     | 2 месяца   |
| Грипп                     | 1 доза - ежегодно.<br>С 6 месяцев.<br>(Сезонно, с 01 октября по 31 марта)                              |  |